



3	مدة الإنجاز	علوم الحياة والارض	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض	الشعبة أو المسلك

يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير المبرمجة

المكون الأول: استرداد المعارف (5 نقط)

I. يوجد اقتراح واحد صحيح بالنسبة لكل معطى من المعطيات المرقمة من 1 إلى 4.
أنقل (ي) الأزواج الآتية على ورقة تحريرك ثم أكتب (ي) داخل كل زوج الحرف المقابل للاقتراح الصحيح:
(1 ، ...) ؛ (2 ، ...) ؛ (3 ، ...) ؛ (4 ، ...) (ن 2)

2. الاستئصال وسيلة لدعم وظيفة الجهاز المناعي توفر:
أ. مناعة نشيطة للجسم ضد مولدات المضاد.
ب. ذاكرة مناعية ضد مولدات المضاد.
ج. حماية فورية ضد مولدات المضاد.
د. خلايا لمفاوية نوعية ضد مولدات المضاد.

1. يتشكل المركب المنيع عن طريق الارتباط بين:
أ. اللمفاويات T_C ومولدات المضاد.
ب. عامل التكملة ومولدات المضاد.
ج. عامل التكملة ومضادات الأجسام.
د. مضادات الأجسام ومولدات المضاد.

4. تتعرف اللمفاويات T_C على الخلايا المعفنة على إثر ارتباط:
أ. المستقبل T والواسم $CD4$ بكل من المحدد المستضادي وجزئية CMH_I .
ب. المستقبل T والواسم $CD8$ بكل من المحدد المستضادي وجزئية CMH_I .
ج. المستقبل T والواسم $CD4$ بكل من المحدد المستضادي وجزئية CMH_{II} .
د. المستقبل T والواسم $CD8$ بكل من المحدد المستضادي وجزئية CMH_{II} .

3. تتجلى الذاكرة المناعية النوعية في:
أ. مضادات الأجسام التي تبقى بتركيز كبير لمدة طويلة في الأنسجة.
ب. البلزميات التي تفرز كميات مهمة من مضادات الأجسام لمدة طويلة.
ج. بعض اللمفاويات النوعية التي تدوم طويلا في الجسم.
د. مولدات المضاد التي يحتفظ بها الجسم لمدة طويلة في الأعضاء اللمفاوية.

II. عرف (ي) العبارات الآتية : أ. المركب الرئيسي للتلاؤم النسيجي. (0.5 ن)
ب. التطعيم الذاتي. (0.5 ن)

III. أنقل (ي) على ورقة تحريرك، الحرف المقابل لكل اقتراح من الاقتراحات الآتية، ثم أكتب (ي) أمامه "صحيح" أو "خطأ". (ن 1)


أ	تتعرف البلعميات الكبيرة بشكل نوعي على مولدات المضاد.
ب	الكريوبينات المناعية هي بروتينات مصلية ترتبط نوعيا بمولد المضاد.
ج	ترتبط الهيستامينات بأغشية الخلايا الهدف لتشكل مركب الهجوم الغشائي.
د	تتمثل مرحلة التحسس الأرجي في ارتباط مضادات الأجسام النوعية للمؤرج بأغشية الخلايا العمادية و القعدات.

IV. اعتمادا على مكتسباتك أجب (ي) على الأسئلة الآتية:

1. ماذا نقصد بإيجابية المصل بالنسبة لفيروس VIH. (0.5 ن)
2. أعط آليتين مختلفتين لتدمير اللمفاويات $T4$ الناتج عن الإصابة بفيروس VIH. (0.5 ن)

المكون الثاني: الاستدلال العلمي والتواصل الكتابي والبياني (15 نقطة)

التمرين الأول (3 نقط)



تقوم الخلايا العضلية بتركيب جزيئات ATP الضرورية لإنجاز المجهود العضلي باعتماد مسالك استقلابية هوائية وأخرى لا هوائية. إلا أنه في بعض الحالات يمكن أن يحدث خلل استقلابي على مستوى أحد هذه المسالك، عند بعض الأشخاص ينجم عن هذا الخل مجموعة من الأعراض من بينها تراكم الحمض اللبني والشعور بالعياء. لفهم العلاقة بين هذه الأعراض وطبيعة الخل الاستقلابي نقترح المعطيات التالية:

المعطى الأول: تقدم الوثيقة 1 أهم التفاعلات الاستقلابية المرتبطة بإنتاج الطاقة على مستوى الخلية في الحالة العادية.

1. بالاستعانة بالوثيقة 1، حدد (ي) مصير حمض البيروفيك على مستوى الخلية ثم احسب (ي) الحويلة الطاقية (عدد جزيئات ATP) لهدم حمض بيروفيك واحد داخل الميتوكوندري. (0.75 ن)

ملحوظة: داخل الميتوكوندري تعطي أكسدة NADH, H^+ واحدة 3ATP وتعطي أكسدة FADH_2 واحدة 2ATP.

المعطى الثاني: قصد علاج بعض الأمراض الفيروسية يتم استعمال مادة INTI (Inhibiteur de la transcriptase inverse)، ينجم عن العلاج بهذه المادة خلل في إنتاج الطاقة من طرف الميتوكوندريات مما يؤدي لمجموعة من الأعراض الجانبية من بينها الشعور بالعياء وتغير تركيز الحمض اللبني في الدم. يقدم جدول الوثيقة 2 نتائج قياس تركيز الحمض اللبني المنتج من طرف الخلايا وقيمة pH الدم مع رسوم تفسيرية لميتوكوندريات عند شخصين أحدهما معالج بمادة INTI والآخر غير معالج.

تركيز الحمض اللبني في الدم (في حالة راحة)	pH الدم	رسوم تفسيرية للميتوكوندريات
الشخص غير المعالج بمادة INTI	عادي	1mmole في اللتر
الشخص المعالج بمادة INTI	حمضي	أكبر من 5mmole في اللتر


بعض بروتينات السلسلة التنفسية في الغشاء الداخلي للميتوكوندري

الوثيقة 2

2. انطلاقا من معطيات جدول الوثيقة 2 قارن (ي) بين النتائج المحصلة عند الشخص المعالج والشخص غير المعالج بمادة


INTI، ثم استنتج (ي)، المسلك الاستقلابي الذي يتأثر بهذه المادة. (1 ن)

المعطى الثالث: داء MELAS هو نوع من الهزال العضلي المرتبط بخلل على مستوى الميتوكوندريات من بين أعراضه تراكم الحمض اللبني في الدم والشعور بالعياء عند القيام بأدنى مجهود عضلي. تقدم الوثيقة 3 رسما توضيحيا لطبيعة الخل المرتبط بهذا الداء على مستوى الميتوكوندريات.



3. بالاستعانة بالوثيقة 3 فسر (ي) آلية تركيب ATP على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري في الحالة العادية ثم بين (ي) تأثير الخلل الملاحظ عند الشخص المصاب بداء MELAS على هذه الآلية. (0.5 ن)
4. باستثمار المعطيات السابقة بين (ي) أن المسلك الاستقلابي السائد في الحالتين (حالة استعمال مادة INTI وحالة داء MELAS) هو مسلك التخمر اللبني ثم فسر (ي) الأعراض الملاحظة في الحالتين. (0.75 ن)

التمرين الثاني (6 نقط)



مرض الليفيه الكيسية (Mucoviscidose) مرض وراثي يتميز بإفراز الخلايا الظهارية لمخاط جد لزج خصوصا في مستوى الرئتين والجهاز الهضمي. من أجل تحديد الأصل الوراثي لهذا المرض نقدم المعطيات الآتية:

- اكتشف الباحثون (1989) أن أعراض مرض الليفيه الكيسية ترتبط ببروتين غشائي يدعى CFTR الذي يسمح بخروج أيونات Cl^- خارج الخلية مما يؤدي إلى الرفع من ميوعة المخاط و تسهيل طرحه خارج الجسم. تقدم الوثيقة 1 العلاقة بين بنية هذا البروتين وحالة المخاط عند شخص سليم وآخر مصاب بمرض الليفيه الكيسية.
- 1. باستغلال معطيات الوثيقة 1، بين (ي) سبب أعراض المرض واستنتج (ي) العلاقة ببروتين- صفة. (1 ن)

- تتحكم في تركيب بروتين CFTR مورثة تحمل نفس الاسم. تقدم الوثيقة 2 جزء من الحليل CFTR العادي (اللوب المنسوخ) عند الشخص السليم وجزء من الحليل CFTR الطافر (اللوب المنسوخ) عند شخص مصاب بمرض الليفيه الكيسية. تمثل الوثيقة 3 مستخرجا من جدول الرمز الوراثي.


رقم الثلاثية	511	508	505
جزء من الحليل CFTR العادي (اللوب المنسوخ)	TTA-TAG-TAG-AAA-CCA-CAA-AGG		
جزء من الحليل CFTR الطافر (اللوب المنسوخ)	TTA-TAG-TAG-CCA-CAA-AGG		
	منحى القراءة →		

الوثيقة 2

الوحدات الرمزية	AAU AAC	AUC AUA	UUU UUC	GGU GGA	GUU GUC	UCC UCG	UGA UAA
الأحماض الأمينية	Asn	Ile	Phe	Gly	Val	Ser	بدون معنى

الوثيقة 3

2. بالاعتماد على الوثيقتين 2 و3، أعط (ي) متتالية ARNm ومنتالية الأحماض الأمينية المقابلة لكل من الحليل العادي والحليل الطافر، ثم فسر (ي) الأصل الوراثي لمرض الليفيه الكيسية.
- تقدم الوثيقة 4 شجرة نسب عائلة بعض أفرادها مصابون بمرض الليفيه الكيسية.



3. بالاعتماد على الوثيقة 4:

- أ. بين (ي) أن الحليل المسؤول عن مرض الليفيه الكيسية متنح ومحمول على صبغيات لاجنسية. (0.75)
- ب. حدد (ي) احتمال إصابة الحمل III₄ بمرض الليفيه الكيسية. علل (ي) جوابك مستعينا (ة) بشبكة التزاوج. (1.25 ن)

(استعمل (ي) الرمز M أو m بالنسبة للحليل المسؤول عن المرض، والرمز N أو n بالنسبة للحليل العادي).

- يعتبر مرض الليفية الكيسية من الأمراض واسعة الانتشار، ويصيب فردا واحدا من كل 2500 مولود جديد في ساكنة أوروبا. باعتبار هذه الساكنة خاضعة لقانون Hardy-Weinberg.

- أ. احسب (ي) تردد الحليل المسؤول عن مرض الليفية الكيسية وتردد الحليل العادي في ساكنة أوروبا. (1ن)
- ب. احسب (ي) تردد الأفراد السليمين الناقلين للمرض. (0.5ن)

التمرين الثالث (3 نقط)

من أجل دراسة بعض جوانب انتقال صفتي لون الجسم ولون العيون عند البعوض تم إنجاز التزاوجات الآتية:

- التزاوج الأول:

بين بعوض من سلالة متوحشة ذات جسم رمادي و عيون أرجوانية وبعوض من سلالة طافرة ذات جسم أسود و عيون فاتحة اللون. أعطى هذا التزاوج جيلا أولا F_1 جميع أفرادهم بمظهر خارجي متوحش.

- التزاوج الثاني:

بين إناث من الجيل F_1 مع ذكور بجسم أسود و عيون فاتحة اللون. أعطى هذا التزاوج جيلا ثانيا F_2' مكون من :

• 159 فردا بجسم رمادي و عيون أرجوانية	• 65 فردا بجسم رمادي و عيون فاتحة اللون
• 162 فردا بجسم أسود و عيون فاتحة اللون	• 64 فردا بجسم أسود و عيون أرجوانية

1. ماذا تستنتج (ي) من نتائج التزاوج الأول ؟ (0.5 ن)

2. باستثمار نتائج التزاوج الثاني بين (ي)، معللا (معللة) إجابتك، أن المورثتين مرتبطتين مرتبطين ثم فسر (ي) باستعمال


رسوم تخطيطية مناسبة الظاهرة المسؤولة عن تشكل مختلف أنماط الأمشاج عند إناث الجيل F_1 . (1 ن)

3. أعط (ي) التفسير الصبغي لنتائج التزاوج الثاني مستعينا (مستعينة) بشبكة التزاوج. (1 ن)

ملحوظة: استعمل (ي) الرمز n^+ و n للتعبير عن حليلي المورثة المسؤولة عن لون الجسم. والرمزين p^+ و p للتعبير عن حليلي المورثة المسؤولة عن لون العيون.

4. احسب (ي) المسافة بين المورثتين المدروستين ثم أنجز (ي) الخريطة العاملية. (0.5 ن)

التمرين الرابع (3 نقط)



الوثيقة 1


تعرف مناطق الطمر نشاطا بركانيا مهما يتميز ببركانية انفجارية مصحوبة بتشكيل صهارة تعطي صخورا أهمها صخرة الأندزيت. تنبعث الصهارة من الأعماق عموديا تحت البراكين، وقد اقترح الجيولوجيون ثلاث فرضيات حول مصدر هذه الصهارة:

- **فرضية 1:** تنتج الصهارة عن انصهار جزئي لصخرة البيريديوتيت المنتمية للرداء العلوي الراكب.
- **فرضية 2:** تنتج الصهارة عن انصهار جزئي لصخرة البازلت المنتمية للقشرة المحيطية المنغرزة.
- **فرضية 3:** تنتج الصهارة عن انصهار جزئي لصخرة البيريديوتيت المنتمية للرداء المنغرز.

للتحقق من هذه الفرضيات نقترح المعطيات الآتية:

- تقدم الوثيقة 1 توزيع خطوط تساوي درجة الحرارة في منطقة الطمر حسب العمق وتموضع ثلاثة عينات صخرية: العينة A و العينة B و العينة C.

1. باستعمال معطيات الوثيقة 1، حدد العمق ودرجة الحرارة التي توجد فيهما كل عينة صخرية (A و B و C). (0.75 ن)
- تقدم الوثيقة 2 نتيجة تجارب حول شروط انصهار صخرة البيريدوتيت غير المميهة (في غياب الماء) والبريدوتيت المميهة (الشكل أ) وشروط انصهار صخرة البازلت غير المميهة والبازلت المميهة (الشكل ب).




2. باستثمار إجابتك على السؤال السابق وبالاتماد على الوثيقة 2:

أ. حدد (ي) المجال الذي تنتمي له كل من العينتين الصخريتين B و C ثم تحقق (ي) من صحة الفرضيتين 2

و 3. (0.75 ن)

- ب- حدد (ي) المجال الذي تنتمي له العينة الصخرية A ثم تحقق (ي) من صحة الفرضية 1 مبينا (مبينة) الشرط الضروري لحدوث الانصهار الجزئي لهذه الصخرة. (0.75 ن)

- للكشف عن مصدر الماء اللازم لتشكيل الصهارة بمنطقة الطمر نتتبع التحولات العيدانية التي تخضع لها الصخور القشرة المحيطية المنغرفة (الصخور R_1 و R_2 و R_3 الممثلة في الوثيقة 1). يقدم الشكل (أ) من الوثيقة 3 مجالات استقرار بعض المجموعات العيدانية بالإضافة إلى ظروف الضغط ودرجة الحرارة التي تشكلت فيها هذه الصخور R_1 و R_2 و R_3 . ويبين الشكل (ب) من نفس الوثيقة بعض التفاعلات العيدانية المرافقة لتحول هذه الصخور.



3. اعتمادا على معطيات الوثيقة 3 فسر (ي) التغيرات العيدانية التي تحدث عند الانتقال من الصخرة R₁ إلى الصخرة R₂ ثم من الصخرة R₂ إلى الصخرة R₃، واستنتج (ي) أصل الماء اللازم لتشكيل الصحارة بمنطقة الطمر. (0.75 ن)

-----§ انتهى §-----

www.9alami.info